

**Kracie**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

**第2類医薬品****漢方製剤**

# 荊芥連翹湯エキス顆粒「クラシエ」 (ケイガイレンギョウトウ)

**特徴**

- 「荊芥連翹湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「万病回春」  
マンビョウカイシン  
鼻病門に収載された処方を基本に、我が国で経験方として発展させた薬方です。
- 顔の色が浅黒く(暗褐色)、手足の裏に脂汗をかきやすく、もともと鼻、耳、扁桃、皮膚粘膜部に化膿炎症をおこしやすい体質の人で、アレルギー等でおきた鼻炎が慢性化し鼻汁が濃くなっている状態の慢性鼻炎、蓄膿症、また慢性扁桃炎、およびにきびにすぐれた効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能**

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

## 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2／3包	
7才未満4才以上	1／2包	
4才未満2才以上	1／3包	
2才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成 分

成人1日の服用量3包（1包1.5g）中、次の成分を含んでいます。

荊芥連翹湯エキス ..... 2,400mg  
〔ケイガイ・レンギョウ・トウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウ・  
オウレン・オウゴン・オウバク・サンシシ・ボウフウ・キヅツ・  
カンゾウ・ハッカ各0.75g、サイコ・キキョウ・ビャクシ各  
1.25gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、  
2日をすぎた場合には服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシ工 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシ工 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574 (〒635-0051)